

DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT

BLOQUEIG ANESTÈSIC DEL GANGLI CELÍAC

..... Núm. HC.....
(nom i cognoms del pacient)
de.....anys, amb DNI núm. i domicili a.....
.....

..... de anys,
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)
amb domicili a i DNI núm.
en qualitat dede
(representant legal, familiar o propparent) (nom i cognoms del / de la pacient)

DECLARO

Que el doctor/a m'ha explicat que
(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació)
pel tractament de la meua malaltia és indispensable l'ANESTÈSIA DEL GANGLI CELÍAC.

EN QUÈ CONSISTEIX EL BLOQUEIG ANESTÈSIC DEL GANGLI CELÍAC

El bloqueig del gangli celíac consisteix a interrompre la innervació simpàtica de les vísceres situades a la part superior de l'abdomen, mitjançant la injecció d'un anestèsic local. Per aconseguir-ho, és necessari realitzar dues petites punxades a l'esquena a banda i banda de la columna. S'anestesia la pell amb anestèsia local i s'introdueixen dues agulles fines fins a localitzar la zona adequada. Un cop col·locades correctament les agulles, s'injecta l'anestèsic local. Cal utilitzar petites quantitats de contrast radiològic per a comprovar la situació de les agulles: de manera que si és al·lèrgic al contrast o ha tingut algun problema en alguna exploració radiològica, comunicui-ho al seu metge.

RISCOS TÍPICS DEL BLOQUEIG ANESTÈSIC DEL GANGLI CELÍAC

Els efectes que vostè pot notar són:

- Es pot produir hipotensió amb sensació de lleuger mareig amb els canvis de postura, en aixecar-se de la posició de tombat.
- També pot aparèixer diarrea en alguns casos.

Aquests efectes desapareixen un cop passada l'acció de l'anestèsic, normalment unes tres o quatre hores després, encara que en alguns pacients pot ser més prolongat.

COMPLICACIONS DEL BLOQUEIG ANESTÈSIC DEL GANGLI CELÍAC

Les complicacions del bloqueig del gangli celíac són rares.

Les més freqüents són:

- Hematoma (acumulació de sang), per punció d'algun de les venes o artèries de l'abdomen: no solen tenir transcendència
- Hematúria que es produeix per punció accidental del ronyó o de les vies urinàries. No té transcendència: normalment desapareix sola i no requereix tractament.

Molt poc freqüents, però més greus, són:

- Que l'anestèsic injectat passi a una de les venes o artèries de l'abdomen, fet que pot provocar pèrdua de consciència, convulsions i coma. Aquesta complicació requeriria mesures de reanimació, com intubació i ventilació mecànica durant unes hores.
- Hemorràgia d'algun dels vasos propers a la zona: és excepcional però podria requerir revisió quirúrgica

RISCOS PERSONALITZATS

Aquests riscos estan relacionats amb l'estat de salut previ del pacient, i els més significatius són:

.....
.....
.....

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir.

Per raons d'organització és possible que l'anestesiòleg que el visita i el que practicarà l'anestèsia no sigui el mateix. En el cas en que durant el procediment sorgeixi alguna situació inesperada que aconselli variar o complementar la tècnica anestèsica prevista inicialment, autoritzo el Servei d'Anestesiologia a realitzar el que cregui convenient o necessari. He entès i accepto que durant el procediment/ tractament es podran realitzar fotografies o gravacions d'imatges, que després es conservaran i es podran transmetre amb finalitats científiques i/o de docència i utilitzar en sessions clíniques, juntes facultatives, conferències, congressos, publicacions mèdiques i actes científics, sense que s'hi identifiqui la meva identitat.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d'aquest procés.

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

CONSENTO

Que se'm realitzi una anestèsia del gangli celíac.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... de 20.....

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

Revoco el consentiment per a la realització de l'anestèsia del gangli celíac.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de de 20.....