

DOCUMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT COLECISTOSTOMIA PERCUTÀNIA

..... Núm. HC.....
(nom i cognoms del pacient)
de.....anys, amb DNI núm. i domicili a.....
.....

..... de anys,
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)
amb domicili a i DNI núm.
en qualitat dede
(representant legal, familiar o propparent) (nom i cognoms del / de la pacient)

DECLARO

Que el doctor/a m'ha informat que
(nom i cognoms del facultatiu/iva que proporciona la informació)
per fer una prova radiològica és necessari injectar-me **COLECISTOSTOMIA PERCUTÀNIA**.

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL PROCEDIMENT DE LA INTERVENCIÓ

La colecistostomia percutània serveix per a drenar (buidar de líquid) la vesícula biliar de pus o bilis, infectada per una inflamació i infecció.

Un cop anestesiada la pell, se li punxarà la vesícula biliar amb una agulla fina, se li col·locarà un tub (catèter) de drenatge durant uns dies fins que es buidi completament i deixi de sortir pus o surti bilis neta. Generalment el tub es manté posat menys de 10 dies però pot ser que el necessiti fins a 30 dies o més.

La intervenció dura aproximadament 20 minuts i por ser necessària la sedació.

BENEFICIS DE LA INTERVENCIÓ

Drenatge de la vesícula biliar.

RISCOS, MOLÈSTIES I EFECTES SECUNDARIS (POSSIBLES PERÒ NO FREQUENTS)

Relacionats amb la tècnica, els més freqüents són lleus:

- Pruija en la introducció de l'anestèsic local, o dolor en el lloc de la punció un cop passa l'efecte de l'anestèsia. També pot donar-se un episodi de calfreds que es resol amb tractament mèdic.
- Si el catèter de drenatge s'obstrueix o es mou de lloc, caldria recol·locar-lo de nou.

Relacionats amb la tècnica i greus:

- Es podria punxar un òrgan de la cavitat abdominal, i generalment no requereix de cap tipus de tractament.
- Sortida de bilis a la cavitat abdominal, que és important i pot requerir intervenció quirúrgica urgent.
- Es podria punxar accidentalment un vas sanguini (artèria o vena) que si sagna molt i de manera excepcional podria requerir tractament.
- Punció accidental de la capa que envolta el pulmó (pleura). Aquesta complicació es denomina pneumotòrax i és molt rara.
- Reaccions al·lèrgiques a l'anestèsia local o sedants que poden arribar a produir un xoc anafilàctic de conseqüències greus.

Relacionats amb el medi de contrast:

- Reaccions al·lèrgiques que poden ser lleus, com a nàusees, picors o lesions a la pell. Rarament greus com alteracions dels ronyons i excepcionalment poden ser molt greus (1 de cada 100.000 pacients)

ALTRES PROCEDIMENTS ALTERNATIUS I RISCOS

Drenatge de la vesícula biliar per intervenció quirúrgica.

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat. També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo.

I, en aquestes condicions,

CONSENTO

Que se'm realitzi una COLECISTOSTOMIA PERCUTÀNIA.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... 20.....

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

DECLARO

Que el doctor/a..... m'ha explicat que en la meva situació és convenient una, que té per objecte

El doctor/a m'ha informat dels riscos que hi pot haver si no es fa aquesta intervenció i que en el meu cas poden augmentar per

He comprès les seves explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill, i el metge/metgessa m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat.

Manifesto que estic satisfet/a de la informació que he rebut i que comprenc l'abast i els riscos de no sotmetre'm al procediment indicat i en tals condicions **NO CONSENTO** sotmetre'm a una.....

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... 20.....