

INFORMACIÓ PACIENT

TRÀNSIT ESOFAGO-GASTRO-DUODENA (TEGD)

TRÀNSIT INTESTINAL (TI)

És un estudi radiològic de l'esòfag, estómac i budell prim. Cal beure un contrast, que conté sulfat de bari que permet veure les estructures digestives en fer radiografies.

S'utilitza per valorar la forma i funció de les estructures digestives, per detectar anomalies com úlceres, tumors, inflamació. Els pacients poden presentar clínica de disfàgia, molèsties a tòrax, dolor abdominal, vòmits, sang a femta...

Preparació

Dejú mínim de 6 hores. És important no fumar, ja que augmenta la secreció gàstrica i pot interferir en l'estudi.

Contrast

Contrast Baritat oral. 1 dosi pel TEGD i per continuar amb el Trànsit Intestinal (TI) 1 altra dosi.

Seqüència

Pacient amb bata, sense penjolls i d'altres objectes que puguin provocar artefactes.

Informació del Radiòleg sobre el motiu de l'exploració

Enquesta mínima radiològica (dejú i possibilitats d'embaràs).

Explicació del procediment. El pacient haurà de beure el bari i adoptar les diferents posicions sobre la taula de radiologia que se l'indiquin.

La duració de l'exploració és d'uns 20 minuts en el cas del TEGD, si es realitza TI l'exploració pot arribar a més de 2 hores (variable segons cada pacient).

Complicacions

Molt escasses. Cal beure líquids en abundància per eliminar més fàcilment el bari.

Limitacions

- Casos d'obstrucció intestinal
- Dones embarassades o sospita d'embaràs.