


FULLA D'INFORMACIÓ D'ATRIPLA®



ATRIPLA® (efavirenz 600 mg, emtricitabina 200 mg, tenofovir disoproxil 245 mg).

Via d'administració: oral

Forma farmacèutica: **comprimits**

Posologia: 1 comprimit al dia. Per tal de reduir els efectes adversos, es recomana prendre amb l'estómac buit i preferiblement abans d'anar a dormir.

Què ha de fer si s'oblida de prendre una dosi?

Si es dona compte dins de les 12 hores següents a l'hora habitual, prengui el comprimit el més abans possible i continui després amb la pauta habitual. Si s'adona de l'oblit passades més de 12 hores de l'hora habitual, no prengui aquesta dosi i reprengui la següent a l'hora habitual. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblidada.

Què he de fer si vomito?

Si vomita quan ha passat menys d'1 hora d'haver pres Atripla®, ha de prendre un altre comprimit. Si vomita més d'1 hora després d'haver pres Atripla®, no és necessari repetir una altra dosi.

Com conservar aquest medicament?

Guardar a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Conservar en l'envàs original per protegir-lo de la humitat. Manténir-lo fora de l'abast dels nens.

Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els efectes adversos més freqüents són:

- **Mareig, dificultat per dormir, somnolència, dificultat per concentrar-se o malsons.** Aquests efectes adversos poden aparèixer des del primer o segon dia de tractament i normalment desapareixen en les primeres dues o quatre setmanes.
- **Erupció cutània, incloent taques o granets vermells o ampolles.**
- **Diarrea, nàusees, vòmits o flatulència (gasos).**
- **Debilitat o dolor muscular**
- **Cansanci**
- **Picor**

- Canvis en el color de la pell (enfosquiment mans i peus).

Si aquests efectes adversos o altres que puguin aparèixer el preocupen, continuen o li causen molèsties importants, consulti amb el seu equip mèdic.

Les anàlisis de sang a part de permetre valorar l'efectivitat del tractament també poden mostrar alteracions com un augment dels nivells de glucosa i lípids.

Poden aparèixer efectes adversos greus encara que són molt poc freqüents: consulti immediatament si apareix inflor de la cara, llavis, parpelles; pensaments anormals; al·lucinacions; espasmes; parla incoherent; pell o ulls groguencs; o una erupció cutània greu.

Interaccions

ATRIPLA® pot interaccionar amb altres medicaments com anticonceptius hormonal, diltiazem o medicaments similars (antagonistes del calci), metadona, sertralina, alguns antibiòtics (rifampicina, claritromicina...), etc. Com a conseqüència, els nivells sanguinis d'ATRIPLA® o d'altres medicaments poden veure's afectats. Això pot impedir que ATRIPLA® o altres medicaments funcionin correctament o augmentin els seus efectes adversos.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol altre medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta).

Està contraindicat prendre ATRIPLA® amb medicaments a base de plantes com els extractes de Ginkgo biloba i l'herba de Sant Joan o hipèric. És important que consulti al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol preparat de vitamines, plantes medicinals o suplement dietètic.

Mentre està fent el tractament, encara pot transmetre el virus a terceres persones, tot i que el tractament redueix el risc.

Les dones en edat fèrtil han d'evitar quedar-se embarassades durant el tractament i fins a 12 setmanes després. Cal combinar diferents mètodes anticonceptius per evitar l'embaràs: un mètode de barrera (preservatiu) i anticonceptius hormonal (orals, implant o injectable).

Per a qualsevol dubte o consulta sobre els medicaments, ens pot telefonar al 972.27.51.30.