


## FULL D'INFORMACIÓ DE TIVICAY®



**TIVICAY® (Dolutegravir 50 mg)**

Via d'administració: **oral**  
Forma farmacèutica: **comprimits**

**Posologia: segons prescripció mèdica.** Els comprimits s'han d'empassar sencers, sense mastegar ni triturar, amb un vas d'aigua. Es poden prendre **AMB** o **SENSE** aliments.

### Com conservar aquest medicament?

Guardar a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Conservar a l'envàs original per protegir-lo de la llum i la humitat. Mantenir fora de l'abast dels nens.

### Què he de fer si m'oblido de prendre una dosi?

Pot recuperar la dosi perduda fins a 4 hores abans de la següent dosi habitual. Si falta menys de 4 hores per prendre la següent dosi, esperi a prendre la següent dosi a l'hora habitual. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblidada.

### Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els efectes adversos més freqüents, que no significa que apareguin a tots els pacients, són:

- **Molèsties gastrointestinals:** nàusea, vòmits, diarrea i dolor abdominal. En cas de diarrea segueixi una dieta astringent (arròs caldós, patata i pastanaga bullides, poma al for...). Si segueix o presenta febre i/o sang juntament amb la diarrea, consulti al seu metge.
- **Mal de cap i marejos**
- **Alteracions del son (insomni, malsos)**
- **Sensació de debilitat, cansament**
- **Trastorns del fetge:** posis en contacte amb el seu metge si refereix algun dels símptomes de trastorns del fetge indicats a continuació: engrogiment de la pell o de l'escleròtica (la part blanca) dels ulls (icterícia), orina de color fosc, femtes de color clar, sensibilitat anormal amb la palpació del costat dret a sota de les costelles.

- Reacció d'hipersensibilitat o reacció al·lèrgica: normalment apareix a las primeres setmanes de tractament. Consulti immediatament si nota qualsevol dels següents símptomes: febre, erupció cutània, envermelliment i/o picors, nàusees i vòmits, diarrea o dolor abdominal, cansament, malestar general, respiració entretallada, dolor de gola o tos.

Si aquests efectes adversos o d'altres que poden aparèixer li preocupen, continuen o li causen molèsties importants, consulti amb el seu equip mèdic.

### Interaccions

---

TIVICAY® pot interaccionar amb altres medicaments. Com a conseqüència, els nivells sanguinis de TIVICAY® o d'altres medicaments poden veure's afectats. Això pot impedir que els medicaments funcionin correctament o empitjorin els seus efectes adversos.

Si pren antiàcids com Almax®, ferro, calci o complexos vitamínics ha de prendre'ls 6 hores abans o 2 hores després de TIVICAY®. No prengui suc de pomelo o herba de Sant Joan durant el tractament.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o a pres recentment qualsevol altre medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta), vitamines, plantes medicinals o suplementes dietètics.

### Precaució

---

Comuniqui al seu metge, si vostè és una dona, si està embarassada o pensa quedar-s'hi. Només hauria d'utilitzar TIVICAY® durant l'embaràs si el benefici esperat justifica el risc potencial per al fetus. S'ha d'evitar la lactància durant el tractament amb TIVICAY®.

TIVICAY® pot causar mareig, si se sent marejat eviti conduir o manejar maquinària pesada.

Per qualsevol dubte o consulta sobre medicaments, ens pot trucar al 972.27.51.30 o escriure'ns a [farmacia@hospiolot.cat](mailto:farmacia@hospiolot.cat)