



INFORMACIÓ PACIENT

POSTOPERATORI DE CATARACTES

SÍMPTOMES

És normal després de la intervenció:

- Sentir una lleugera coïssor a l'ull.
- Tenir un lleuger envermelliment a l'ull.
- Notar una sensació de fregament sota la parpella superior.
- Veure una mica borrós.

POT FER:

Pot dutxar-se, tot i que, ha d'evitar de mullar-se l'ull operat.

Passejar pel carrer (evitar caigudes).

Mirar la televisió.

Dormir de panxa enlaire, o del costat no operat.

Prendre analgèsics.

NO POT FER

No pot fer esforços, ajupir-se, aixecar pesos, treballar a l'hort.

No pot conduir.

No pot fregar-se l'ull.

No pot nedar a la platja ni a la piscina amb el cap sota l'aigua.

SIGNES D'ALARMA

Tenir un dolor intens

No poder veure ni la llum.

Tenir secreció purulenta.

En aquests casos cal venir al Servei d'Urgències si no té visita prèvia amb el seu metge/essa.

**SI VOL FER-NOS ALGUNA CONSULTA, EL NOSTRE HORARI D'HOSPITAL DE DIA ÉS DE
7:30 A 20h AL TELÈFON 972 261 800 EXTENSIÓ 6096**