

DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT

BLOQUEIG NEUROLÍTIC DEL GANGLI CELÍACS PER VIA POSTERIOR

..... Núm. HC.....
(nom i cognoms del pacient)
de.....anys, amb DNI núm. i domicili a.....
.....

..... de anys,
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)
amb domicili a i DNI núm.
en qualitat dede
(representant legal, familiar o propparent) (nom i cognoms del / de la pacient)

DECLARO

Que el doctor/a m'ha explicat que
(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació)
és necessari/convenient un bloqueig neurolític del gangli celíac per via posterior.

EN QUÈ VONSISTEIX EL BLOQUEIG NEUROLÍTIC DEL GANGLI CELÍACS PER VIA POSTERIOR

El bloqueig del gangli celíac consisteix a interrompre la innervació simpàtica de les vísceres situades a la part superior de l'abdomen, mitjançant la injecció d'un líquid, normalment alcohol o fenol. L'efecte és el de produir una destrucció dels ganglis simpàtics d'aquesta zona. Per això és necessari realitzar dues petites punxades a l'esquena a banda i banda de la columna: s'anestesia la pell amb anestèsia local i s'introdueixen dues agulles fines fins a localitzar la zona adequada. Un cop col·locades correctament les agulles, es procedeix a injectar l'alcohol o fenol. Cal utilitzar petites quantitats de contrast radiològic per a comprovar la situació de les agulles, de manera que si és al·lèrgic al contrast o ha tingut algun problema en alguna exploració radiològica, comuniqui-ho al seu metge. El bloqueig es realitza amb anestèsia local, encara que en el moment d'injectar el líquid neurolític és possible que se li administri una dosi de sedant per evitar que noti dolor.

RISCOS TÍPICS DEL BLOQUEIG NEUROLÍTIC DEL GANGLI CELÍACS PER VIA POSTERIOR

Els efectes que vostè pot notar són:

- Es pot produir hipotensió amb sensació de mareig lleuger, amb els canvis de postura, en aixecar-se des de la posició de tombat.
- També pot aparèixer diarrea en alguns casos.

Aquests efectes desapareixen passades entre una i tres setmanes, encara que en alguns pacients poden ser més prolongats.

COMPLICACIONS DEL BLOQUEIG NEUROLÍTC DEL GANGLI CELÍACS PER VIA POSTERIOR

Les complicacions del bloqueig del gangli celíac són rares.

Les més freqüents són:

- Hematoma (acumulació de sang), per punció d'alguna de les venes o artèries de l'abdomen: no solen tenir transcendència
- Hematúria que es produeix per punció accidental del ronyó o de les vies urinàries: no té transcendència, normalment desapareix sola i no requereix tractament.

Molt poc freqüents però més greus són:

- Pas del líquid neurolític a l'espai de la columna vertebral on es troba la medulla espinal; pot produir seqüeles neurològiques com paràlisi i pèrdua del control de l'orina i la femta. Aquesta complicació és raríssima.
- Afectació d'alguna arrel nerviosa al llarg del seu trajecte des de la sortida de la columna, pel líquid neurolític, que pot produir una neuritis amb dolor abdominal cremant que pot persistir diverses setmanes.
- Hemorràgia dels vasos situats en la proximitat que poden ser importants i requerir una intervenció quirúrgica. És excepcional

RISCOS PERSONALITZATS

.....
.....
Aquests riscos estan relacionats amb l'estat de salut previ del pacient, i els més significatius són:

.....
.....
He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir.

Per raons d'organització és possible que l'anestesiòleg que el visita i el que practicarà l'anestèsia no sigui el mateix. En el cas en que durant el procediment sorgeixi alguna situació inesperada que aconselli variar o complementar la tècnica anestèsica prevista inicialment, autoritzo el Servei d'Anestesiologia a realitzar el que cregui convenient o necessari. He entès i accepto que durant el procediment/ tractament es podran realitzar fotografies o gravacions d'imatges, que després es conservaran i es podran transmetre amb finalitats científiques i/o de docència i utilitzar en sessions clíniques, juntes facultatives, conferències, congressos, publicacions mèdiques i actes científics, sense que s'hi identifiqui la meva identitat.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d'aquest procés.

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

CONSENTO

Que em sigui practicat el bloqueig del gangli celíac.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... de 20.....

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

Revoco el consentiment per a la realització del bloqueig neurolític del gangli celíacs.

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de de 20.....