

DOCUMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT RECANVI O RETIRADA PRÒTESI ARTICULAR

..... Núm. HC.....
(nom i cognoms del pacient)
de.....anys, amb DNI núm. i domicili a.....
.....

.....
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)
amb domicili a
i DNI núm., en qualitat de representat legal/ familiar o de parentesc de
.....

(nom i cognoms del pacient)

DECLARO

Que el doctor/am'ha explicat que

(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació)

és necessari/convenient en la meva situació, sotmetre'm a un tractament quirúrgic de RECANVI o
RETIRADA DE PRÒTESI ARTICULAR.

PREOPERATORI

Abans de la cirurgia és necessari realitzar algunes proves diagnòstiques, com analítica, radiografies o electrocardiograma. També li indicarem des de quina hora ha d'estar en dejú.

PROCEDIMENT

Una pròtesi desgastada, mobilitzada, trencada en algun dels seus components o infectada, normalment necessita una nova operació, ja sigui per treure-la o per canviar-la.

La intervenció consisteix en l'extracció de la pròtesi, del ciment, en cas que n'hi hagi, i si és possible, en la col·locació d'una nova.

L'objectiu de la intervenció és calmar el dolor i intentar millorar la mobilitat i la incapacitat. També té com a objectiu eliminar la infecció en cas que n'hi hagi. També té com a propòsit intentar eliminar la infecció, en el cas que existeixi.

El procediment normalment necessita anestèsia general, encara que, en alguns casos, pugui fer-se amb anestèsia de cintura en avall. El Servei d'Anestesiologia estudiarà les seves característiques personals i l'informarà de quina és l'anestèsia més adequada en el seu cas.

Per reduir la incidència de dues de les complicacions principals, aparició de trombosi a les venes o

infecció postoperatòria, s'administrarà la medicació corresponent.

CONSEQÜÈNCIES SEGURES

Per retirar la pròtesi sol ser necessari treure part de l'os que hi ha al voltant, o bé retirar del seu lloc un tros de fèmur que més tard haurem de fixar.

Si s'opta pel recanvi de l'articulació, sol necessitar un implant més gran que tingui algun suplement per estabilitzar la pròtesi, o la utilització d'empelts ossis (del mateix pacient, del banc d'ossos o artificial). La col·locació de la pròtesi sol tenir com a conseqüència l'allargament o escurçament de la cama intervinguda.

Si només es retira la pròtesi, l'extremitat intervinguda sol quedar més curta i amb el peu girat cap a fora.

En cas d'infecció es podria posar en el mateix acte operatori una nova pròtesi, sempre que tinguem la certesa que l'os ha quedat net. Habitualment, es fa una primera intervenció de neteja i posteriorment es fa una segona intervenció per implantar una nova pròtesi. En alguns casos es pot utilitzar un espaiador de ciment impregnat d'antibiòtics fins que es realitza la segona intervenció.

Durant l'operació hi ha una pèrdua de sang que pot requerir transfusions sanguínies. El Servei d'Hematologia l'informarà de les possibles complicacions.

Després de la intervenció notarà molèsties a la zona operada, a causa de la cirurgia i de l'adaptació dels músculs de la zona. Aquestes molèsties poden durar algunes setmanes, mesos i rarament poden ser permanents.

Necessitarà repòs al llit durant uns dies o bé caminar sense posar el peu a terra.

Igualment, rebrà instruccions sobre la rehabilitació que ha de fer, els moviments que cal evitar i com fer servir les crosses.

La força muscular es recupera parcialment quan desapareix el dolor. La mobilitat de l'articulació sol millorar, encara que el grau de recuperació depèn de la rigidesa que tingués abans de la intervenció.

La pròtesi no és una intervenció definitiva, ja que amb el temps es desgasta o s'afluixa, i pot requerir una nova intervenció (més freqüent en els pacients més joves o més actius).

DESCRIPCIÓ DELS RISCOS TÍPICS

La cirurgia de RECANVI O RETIRADA DE LA PRÒTESI ARTICULAR pot presentar complicacions:

- Tota intervenció quirúrgica porta implícites una sèrie de complicacions comunes i potencialment serioses, tant per la pròpia tècnica operatòria com per la situació vital de cada pacient (diabetis, cardiopatia, hipertensió, edat avançada, anèmia, obesitat...), que podrien fer variar la tècnica operatòria programada, necessitar tractaments complementaris, tant mèdics com quirúrgics; i també poden implicar un mínim percentatge de mortalitat.
- Obstrucció venosa amb formació de trombos, inflor de la cama corresponent i en rares ocasions es complica amb dolor toràcic i dificultat respiratòria (embòlia pulmonar), que pot conduir a la mort.

- Infecció de la pròtesi: aquesta pot ser superficial (es pot resoldre amb neteja local i antibiòtics) o profunda (generalment s'ha de retirar l'implant). Aquesta complicació pot passar, fins i tot, anys després de la intervenció. Quan s'efectuï una altra intervenció o una manipulació dental pot disseminar-se una infecció per la sang que pot afectar la seva pròtesi. Per aquest motiu ho haurà d'especificar al metge/essa encarregat del procés.
- Lesió dels nervis de l'extremitat, que pot condicionar una disminució de la sensibilitat o una paràlisi. Aquesta lesió pot ser temporal o definitiva.
- Lesió dels vasos de l'extremitat. Si la lesió és irreversible, pot necessitar l'amputació de l'extremitat.
- Trencament o perforació d'un os en col·locar la pròtesi o posterior.
- Luxació: en la majoria dels casos, pot col·locar-se en un lloc sense necessitat d'operar. En altres ocasions s'ha de canviar l'implant. Després de la luxació, sol col·locar-se un aparell extern per mantenir l'articulació al seu lloc.
- Limitació de la mobilitat de l'articulació secundària, en general, a l'aparició de calcificacions al voltant de la pròtesi.
- Rigidesa del genoll per la formació d'una cicatriu adherent, que pot requerir una mobilització amb anestèsia.
- De forma poc comuna poden existir altres complicacions: hipotensió arterial severa, al realitzar la fixació de la pròtesi, que pot conduir a una parada cardíaca i originar la mort; fallada renal, per compressió de la cama contrària; reacció al·lèrgica/toxicitat a causa del material implantat i falta d'unió d'un fragment del fèmur, que durant l'operació pot haver-se de tallar per realitzar la operació.

ALTERNATIVES DE TRACTAMENT

Com a alternativa al procediment proposat, podrà seguir amb tractament analgèsic i antiinflamatori, efectuar repòs i descarregar les articulacions de l'extremitat. Aquest tractament només millora els símptomes, però no para el desgast progressiu de l'articulació, l'afluixament o el trencament de l'implant. En cas d'infecció de la pròtesi la intervenció és inevitable.

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir com:

.....
.....

Si en el moment de l'acte quirúrgic sorgís algun imprevist, l'equip mèdic podria variar la tècnica quirúrgica programada. He entès i accepto que durant el procediment/ tractament es podran realitzar fotografies o gravacions d'imatges, que després es conservaran i es podran transmetre amb finalitats científiques i/o de docència i utilitzar en sessions clíniques, juntes facultatives, conferències, congressos, publicacions mèdiques i actes científics, sense que s'hi identifiqui la meua identitat.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d'aquest procés.

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

CONSENTO

Que em sigui practicat el procediment/ tractament quirúrgic de **RECANVI O RETIRADA D'UNA PRÒTESI ARTICULAR** de:.....

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... de 20.....

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

DECLARO

Que el doctor/a..... m'ha explicat que en la meua situació és convenient una, que té per objecte

El doctor/a m'ha informat dels riscos que hi pot haver si no es fa aquesta intervenció i que en el meu cas poden augmentar per

He comprès les seves explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill, i el metge/metgessa m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat.

Manifesto que estic satisfet/a de la informació que he rebut i que comprenc l'abast i els riscos de no sotmetre'm al procediment indicat i en tals condicions **NO CONSENTO** sotmetre'm a una.....

Pacient o representant legal

Metge/metgessa informant

Olot, de..... de 20.....