


FULLA D'INFORMACIÓ DE STRIBILD®

 <p>The image shows the packaging for Stribild. On the left is a box labeled 'Stribild® 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg film-coated tablets'. On the right is a white plastic bottle with a label that matches the box. In front of the bottle are several green, oval-shaped tablets.</p>	<p>STRIBILD® (Elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabina 200 mg i tenofovir disoproxil 245 mg).</p> <p><u>Conté lactosa.</u></p> <p>Via d'administració: oral Forma farmacèutica: comprimits</p> <p>Posologia: 1 comprimit al dia amb aliments. Els comprimits han d'empassar-se sencers, sense mastegar ni triturar, amb un vas d'aigua.</p>
---	---

Què ha de fer si s'oblida de prendre una dosi?

Si es dona compte dins de les 18 hores següents a l'hora habitual, prengui el comprimit juntament amb aliments. Després prengui la següent dosi tal com ho fa normalment. Si s'adona passades 18 hores, no prengui aquella dosi i prengui la següent a l'hora habitual. No dobli mai la dosi per compensar l'oblidada.

Què ha de fer si vomita?

Si vomita menys d'1 hora després de prendre Stribild®, ha de prendre un altre comprimit. Passat aquest temps, no és necessari repetir la dosi.

Com conservar aquest medicament?

Ha de conservar-se a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Mantingui'l fora de l'abast dels nens.

Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els més freqüents són:

- **Digestius: diarrea, nàusees i/o vòmits.** En cas de diarrea segueixi una dieta astringent (arròs, patata i pastanaga bullides, pomes al forn...). Si persisteix o té febre i/o sang a part de la diarrea, consulti al seu metge o farmacèutic.
- **Mal de cap i marejos.** Pot prendre paracetamol.
- **Erupcions cutànies i fotosensibilitat.** S'aconsella una bona hidratació de la pell mitjançant l'aplicació diària de cremes hidratants i protectors solars en cas d'exposició al sol.

- **Alteracions del son** (insomni, malsons). Si apareixen, eviti consumir cafè o te o altres begudes estimulants per la tarda/nit i intenti anar a dormir sempre a la mateixa hora.

Si aquests efectes adversos o d'altres que poguessin aparèixer el preocupen, continuen o li causen molèsties importants consulti al seu equip mèdic.

Interaccions

STRIBILD® pot interaccionar amb altres medicaments. Com a conseqüència, els nivells sanguinis de STRIBILD® o d'altres medicaments poden veure's afectats. Això pot impedir que el tractament funcioni correctament o empitjorin els efectes adversos.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol altre medicament. **Això inclou els medicaments adquirits sense recepta i plantes medicinals.**

També està **contraïndicat el suc d'aranja** (però no altres cítrics) perquè poden augmentar els efectes adversos.

Per qualsevol altre dubte o consulta sobre els medicaments que pren, ens pot trucar al 972.27.51.30.