


## FULLA D'INFORMACIÓ D'EIPLERA®

 <p>The image shows the packaging for Eviplera. On the left is a box labeled 'Eviplera® 200 mg/25 mg/245 mg film-coated tablets' containing 30 tablets. On the right is a white plastic bottle with a white cap, also labeled 'Eviplera® 200 mg/25 mg/245 mg film-coated tablets'. In front of the box and bottle are several light-colored, oval-shaped tablets.</p>	<p><b>EIPLERA®</b> (emtricitabina 200 mg, rilpivirina 25 mg i tenofovir disoproxil 245 mg).</p> <p><u>Conté lactosa.</u></p> <p>Via d'administració: oral Forma farmacèutica: <b>comprimits</b></p> <p><b>Posologia: <u>1 comprimit al dia amb aliments (un àpat equivalent a 400 kcal).</u></b> Els comprimits s'han d'empassar sencers, sense mastegar ni triturar, amb un vas d'aigua.</p>
--	---

### Com conservar aquest medicament?

Guardar a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Conservar en l'envàs original per protegir-lo de la humitat. Mantenir-lo fora de l'abast dels nens.

### Què he de fer si m'oblido de prendre una dosi?

Si es dona compte dins de les 12 hores següents a l'hora habitual de la presa, prengui el comprimit juntament amb aliments. Després prengui la següent dosi a l'hora habitual. Si es dona compte després de 12 hores, salti aquesta dosi i repregui la següent a l'hora habitual. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblidada.

### Què he de fer si vomito?

Si vomita abans que hagin transcorregut 4 hores d'haver pres Eviplera®, prengui un altre comprimit amb aliments. Si vomita passades 4 hores d'haver pres Eviplera®, no és necessari repetir una altra dosi.

### Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els més freqüents són:

- **Digestius: diarrea i altres alteracions gastrointestinals** com nàusees i vòmits. En cas de diarrea segueixi una dieta astringent (arròs caldós, patata i pastanaga bullits, poma al forn...). Si persisteix o presenta febre i/o sang junt amb la diarrea, consulti al seu metge.
- **Mal de cap i marejos.**

- Erupcions.
- Alteracions del son (insomni, malsons).
- Sensació de debilitat

Si aquests efectes adversos o altres que puguin aparèixer el preocupen, continuen o li causen molèsties importants, consulti amb el seu equip mèdic.

Les anàlisis de sang a part de permetre valorar l'efectivitat del tractament també poden mostrar alteracions com un augment dels nivells de colesterol i triglicèrids.

## Interaccions

---

EVIPLERA® pot interaccionar amb altres medicaments. Com a conseqüència, els nivells sanguinis d'EVIPLERA® o d'altres medicaments poden veure's afectats. Això pot impedir que els medicaments funcionin correctament o empitjorin els seus efectes adversos.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol altre medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta), vitamines, plantes medicinals o suplementes dietètics.

En cas d'utilitzar **antiàcids** (hidròxid d'alumini/magnesi o carbonat càlcic), prengui'l almenys 2 hores abans o 4 hores després d'EVIPLERA®.

Els **antagonistes H2** (ranitidina, famotidina, cimetidina o nizatidina), han de prendre's almenys 12 hores abans o 4 hores després d'EVIPLERA®. Aquests medicaments només poden prendre's un cop al dia (NO en una pauta de dues dosis diàries) si està prenent EVIPLERA®.

Per un altre costat, els **inhibidors de la bomba de protons** (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol...) estàn contraindicats quan s'està en tractament amb EVIPLERA® ja que disminueixen el seu efecte.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre els medicaments, ens pot telefonar al 972.27.51.30 o escriu'ns a [farmacia@hospiolot.cat](mailto:farmacia@hospiolot.cat)