


FULL D'INFORMACIÓ DE TARCEVA®

	<p>TARCEVA® (Erlotinib 100 mg o Erlotinib 150 mg)</p> <p>Forma farmacèutica: comprimits Via d'administració: oral</p> <p>Posologia: La dosis recomanada és segons prescripció mèdica. 1 cop al dia SENSE aliments, és a dir, una hora abans o dues després de menjar. Els comprimits han d'empassar-se sencers amb un vas d'aigua, sense mastegar ni xupar a la boca. Si té problemes per empassar-se'l pot dissoldre'l amb una mica d'aigua i prendre'l immediatament. Intenti mantenir sempre el mateix horari. Eviti el contacte amb la pell. Rentis les mans abans i després de cada presa.</p>
---	---

Com conservar aquest medicament?

Ha de conservar-se a temperatura ambient en un lloc fresc i sec, dins l'envàs original per protegir-lo de la llum i la humitat. Mantingui'l fora de l'abast dels nens.

Què he de fer si oblidó prendre una dosi?

Si s'ha oblidat de prendre una dosi: prengui-la lo abans possible. Si han passat més de 12 hores de l'hora habitual, no prengui aquesta dosi i reprengui la següent a l'hora habitual.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblidada.

Què he de fer si vomito?

Només repeteixi la dosi si vomita quan ha passat menys de 30 minuts des de la última presa.

Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els efectes adversos més freqüents, que no significa que apareguin a tots els pacients, són:

- Diarrea, nàusees i vòmits
- Envermelliment i sequedat de la pell, picor. Picor i envermelliment als ulls
- Dificultat per respirar, tos
- Major susceptibilitat a patir infeccions. Ha de prendre mesures higièniques
- Dolor, envermelliment, o llagues a la boca
- Cansament, fatiga
- Disminució de la gana, pèrdua de pes

Comenti amb el seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o qualsevol altre que cregui que pot estar relacionat amb la medicació.

Avisi ràpidament al seu metge si té:

- Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultats al respirar...)
- Signes d'infecció com tos, calfreds, febre > 38°C, dificultats per orinar
- Signes de sagnat com femtes negres, sang a la orina o hematomes importants
- Ulls o pell groguencs
- Enfosquiment de l'orina o femtes blanques
- Dificultat greu per respirar o empitjorament sobtat de la capacitat per respirar, que pot anar acompanyat de tos o febre.
- En cas de sobredosi

Interaccions

TARCEVA® pot interaccionar amb altres medicaments i, com a conseqüència, els nivells sanguinis de TARCEVA® o d'altres medicaments poden veure's afectats. Això pot impedir que TARCEVA® o altres medicaments funcionin correctament o augmentin els seus efectes adversos. Els medicaments que poden interaccionar són:

- Antifúngics (per tractar fongs): ketoconazol, voriconazol, itraconazol
- Antibiòtics: eritromicina, claritromicina, rifampicina
- Antivírics: nelfinavir, indinavir, atazanavir, nefazodona, ritonavir, saquinavir
- Antiepilèptics: fenitoïna, carbamazepina, fenobarbital
- Anticoagulants: warfarina, acenocumarol
- Herba de Sant Joan o hipèric
- Suc de pomelo

Prengui els antiàcids i els protectors gàstrics 4 hores abans o 2 hores després de TARCEVA®.

És recomanable deixar de fumar durant el tractament amb TARCEVA®, ja que la quantitat de fàrmac a la sang es redueix en fumadors en comparació amb no fumadors.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol altre medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta). És important que consulti al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol preparat de vitamines, plantes medicinals o suplementes dietètics.

PRECAUCIONS

Eviti el contacte amb la pell. Renti's les mans abans i després de cada presa.

Adopti 2 mesures anticonceptives si la seva parella pot quedar-se embarassada i mantingui-les fins 2 setmanes després de finalitzar el tractament.

Es recomana utilitzar gel de bany sense detergent, cremes hidratants d'avena o aloe vera i xampú suau.

Protegeixi's del sol amb vestuari adequat i crema amb filtre solar de protecció superior a 15.

Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de rebre vacunes.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre els medicaments, ens pot trucar al
972.27.51.30.