

FULLA D'INFORMACIÓ DE ZARZIO® (Filgrastim)

	<p>ZARZIO® (Filgrastim).</p> <p>Via d'administració: subcutània (sota la pell)</p> <p>Forma farmacèutica: xeringa precarregada</p> <p>Dosis comercialitzades: 300 mcg (=30 MIU) i 480 mcg (=48 MIU).</p>
---	---

Per què serveix aquest medicament?


Filgrastim s'utilitza per estimular la producció de glòbuls blancs (cèl·lules de defensa) a la medul·la òssia. La dosi recomanada és segons prescripció mèdica.

Com ha de conservar aquest medicament?

Cal conservar-lo a la NEVERA (entre 2°C i 8°C) i protegit de la llum. MAI guardi aquest medicament al congelador. Mantingui'l fora de l'abast dels nens.


Com s'ha d'administrar?

- Abans d'administrar el medicament, deixi la xeringa uns minuts a temperatura ambient.
- Per cada administració canviï el lloc d'administració, alternant entre la part del darrere del braç, abdomen i part superior de la cuixa.



- Comprovi l'aspecte de la xeringa (ha de ser un líquid transparent i incolor), en cas contrari, no l'utilitzi.
- Netegi's les mans correctament.
- Preparació de la injecció:
 - Retiri el tap de l'agulla tirant suaument.
 - No toqui l'agulla ni empenyi l'èmbol.
 - És possible que observi una petita bombolla d'aire. No s'ha d'extreure ja que la injecció de la bombolla d'aire no és perjudicial.
 - Desinfecti's la zona on s'ho administrerà amb un cotó amb alcohol.

- Pessigui's la pell amb els dits polze i índex, sense prémer fort.
- Introdueixi l'agulla en tota la seva longitud formant un angle de 45°.
- Tiri lleugerament de l'èmbol per assegurar-se que no s'ha punxat una vena. Si veu sang, retiri l'agulla i inserti-la en un altre lloc.
- Injecti la dosi de forma lenta i constant mantenint pessigada la pell.
- En acabar la injecció, retiri l'agulla, allunyi-la de vostè i de terceres persones i activi el dispositiu de seguretat pressionant l'èmbol. Escoltarà un "click" que confirma la correcta activació d'aquest dispositiu. L'agulla es cobrirà amb una funda protectora per tal que no es punxi.



Precaucions

- No administrar el mateix dia de la quimioteràpia ni 24 hores abans.
- Consulti el seu metge si vostè és al·lèrgic al làtex ja que la coberta de l'agulla conté cautxú natural (un derivat del làtex) i li podria provocar reaccions al·lèrgiques.

Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els més freqüents tot i que no significa que apareguin en tots els pacients, són:

- **Dolor muscular i ossi**
- **Mal de cap**
- **Reacció al lloc de la injecció:** envermelliment, picor, inflamació i dolor
- **Cansament, pèrdua de la gana**
- **Nàusees, vòmits, estrenyiment i diarrea**
- **Tos**

Avisi ràpidament al seu metge si presenta...

- **Una reacció al·lèrgica greu** (envermelliment de la pell, dificultat per respirar...).
- **Signes d'infecció** com tos, calfreds, febre >38°C, dificultat en orinar.
- **Signes de sagnat** com femtes negres, sang a l'orina o hematomes importants.
- **Palpitacions**
- **Dolor abdominal** (a la part superior esquerra de la panxa)
- **En cas de sobredosi**