


FULLA D'INFORMACIÓ DE REZOLSTA®

| | |
|---|--|
|  | <p>REZOLSTA® (darunavir 800 mg/ cobicistat 150 mg)</p> <p>Forma farmacèutica: comprimits</p> <p>Via d'administració: oral</p> <p>Posologia: <u>1 comprimit al dia amb aliments</u></p> |
|---|--|

Com conservar aquest medicament?

Ha de conservar-se a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Mantingui'l fora de l'abast dels nens.

Què he de fer si oblidó prendre una dosi?

Si s'adona de l'oblit dins de les 12 hores següents a l'hora habitual, prengui la dosi oblidada. Després prengui la següent com ho fa habitualment. Si s'adona passades 12 hores, no prengui la dosi oblidada i prengui la següent a l'hora habitual. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblidada.

Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els més freqüents són:

- **Diarrea i altres molèsties gastrointestinals.** En cas de diarrea segueixi una dieta astringent (caldo d'arròs, patata i pastanaga bullides, pomes al forn...). Si persisteix o presenta febre i/o sang juntament amb la diarrea consulti al seu metge o farmacèutic.
- **Nàusees i/o vòmits.** Faci àpats lleugers però mengi més freqüentment (per exemple, 5 vegades/dia).
- **Pèrdua de la gana**
- **Mal de cap**
- **Erupcions cutànies i picor.** S'aconsella una bona hidratació de la pell mitjançant l'aplicació diària de cremes hidratants.
- **Cansanci, dolors musculars.**

Si aquests efectes adversos o altres que apareguessin el preocupen, continuen o li causen molèsties importants consulti amb el seu equip mèdic.

Interaccions

Alguns medicaments poden afectar el funcionament de Rezolsta®, o augmentar la probabilitat de sofrir efectes adversos. Rezolsta® també pot afectar al funcionament d'altres medicaments. Per tant, és necessari que informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol altre medicament. **Això inclou els medicaments adquirits sense recepta, vitamines i plantes medicinals.** També està **contraïndicat el suc d'aranja** (però no altres cítrics) perquè poden incrementar els efectes adversos.

Mentre està fent el tractament, encara pot transmetre el virus a terceres persones, tot i que el tractament redueix el risc.
Es desconeixen els efectes de REZOLSTA sobre el fetus, pel que si vostè planeja quedar-se embarassada consulti abans el seu metge.
Està contraïndicada la lactància materna, tant per la possibilitat de transmetre al seu fill la infecció a través de la llet materna, com pels efectes desconeguts que pot tenir en ell aquest medicament.

Per qualsevol altre dubte o consulti, pot trucar-nos al 972.27.51.30.