

FULLA D'INFORMACIÓ DE TRIUMEQ®



TRIUMEQ® (Dolutegravir 50 mg, Abacavir 600 mg i Lamivudina 300 mg).

Via d'administració: **oral**

Forma farmacèutica: **comprimits**

Posologia: 1 comprimit al dia amb o sense aliments. Els comprimits s'han d'empassar sencers, sense mastegar ni triturar, amb un vas d'aigua.

Com conservar aquest medicament?

Guardar a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Conservar en l'envàs original per protegir-lo de la humitat. Mantener-lo fora de l'abast dels nens.

Què he de fer si m'oblido de prendre una dosi?

Pot recuperar la dosi perduda fins a 4 hores abans de la següent dosi habitual. Si falta menys de 4 hores per prendre la següent dosi, salti aquesta dosi i repregui la següent a l'hora habitual. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblidada.

Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els efectes adversos més freqüents, que no significa que apareguin a tots els pacients, són:

- **Molèsties gastrointestinals:** nàusees, vòmits, diarrea i dolor abdominal. En cas de diarrea segueixi una dieta astringent (arròs caldós, patata i pastanaga bullits, poma al forn...). Si persisteix o presenta febre i/o sang junt amb la diarrea, consulti al seu metge.
- **Mal de cap i marejos.**
- **Alteracions del son** (insomni, malsons).
- **Sensació de debilitat, fatiga**
- **Reacció d'hipersensibilitat o reacció al·lèrgica:** normalment apareix les primeres setmanes de tractament. Consulti immediatament si nota qualsevol dels següents símptomes: febre, erupció cutània, envermelliment i/o picors, nàusees i vòmits, diarrea o dolor abdominal, cansament, malestar general, respiració entretallada, dolor de gola o tos.

Si aquests efectes adversos o altres que puguin aparèixer el preocupen, continuen o li causen molèsties importants, consulti amb el seu equip mèdic.

Interaccions

TRIUMEQ® pot interaccionar amb altres medicaments. Com a conseqüència, els nivells sanguinis de TRIUMEQ® o d'altres medicaments poden veure's afectats. Això pot impedir que els medicaments funcionin correctament o empitjorin els seus efectes adversos.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol altre medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta), vitamines, plantes medicinals o suplement dietètics. No prengui suc de pomelo o herba de Sant Joan durant el tractament.

Alerta

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si quedés embarassada durant el tractament informi immediatament al seu metge. S'ha d'evitar la lactància materna durant el tractament amb TRIUMEQ®.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre els medicaments, ens pot telefonar al 972.27.51.30 o escriu'ns a farmacia@hospiolot.cat