


FULLA D'INFORMACIÓ DE ZYTIGA®

	<p>ZYTIGA® (Abiraterona 250 mg)</p> <p>Via d'administració: oral</p> <p>Forma farmacèutica: comprimits</p> <p>Posologia: 4 comprimits al dia. S'han de prendre amb l'estómac buit, una hora abans o dues hores després de menjar. L'hora ideal és a mig matí. Els comprimits s'han d'empassar sencers amb un got d'aigua, sense mastegar ni desfer a la boca.</p>
---	--

Què ha de fer si s'oblida de prendre una dosi?

Si se n'adona dins de les 12 hores següents a l'hora habitual, prengui els comprimits el més aviat possible i continui després amb la pauta habitual. Si s'adona de l'oblit passades més de 12 hores de l'hora habitual, no prengui aquesta dosi i repregui la següent a l'hora habitual. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblidada.

Què he de fer si vomito?

Si vomita quan han passat menys de 30 minuts després d'haver pres Zytiga®, ha de prendre uns altres 4 comprimits. Si vomita després de 30 minuts d'haver pres Zytiga®, no és necessari repetir una altra dosi.

Com conservar aquest medicament?

Guardar a temperatura ambient en un lloc fresc i sec. Conservar en l'envàs original per protegir-lo de la llum i la humitat. Mantenir-lo fora de l'abast dels nens.

Quins efectes adversos poden aparèixer?

Els efectes adversos més freqüents, que no significa que apareguin a tots els pacients, són:

- **Augment de la pressió arterial.** Es recomana seguir controls rutinaris
- **Retenció de líquids i hipopotassèmia.** Els edemes a les extremitats inferiors són un símptoma de retenció de líquids.
- **Diarrea, nàusees i vòmits**
- **Cansament, fatiga**
- **Infecció urinària, tos**
- **Augment del colesterol**
- **Alteracions cardíaques**

Comenti amb el seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o qualsevol altre que cregui que pot estar relacionat amb la medicació.

Avisi ràpidament al seu metge si té:

- Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultats al respirar...)
- Signes d'infecció com tos, calfreds, febre > 38°C, dificultats per orinar
- Dificultat greu per respirar o empitjorament sobtat de la capacitat per respirar, que pot anar acompanyat de tos o febre.
- En cas de sobredosi

Interaccions

ZYTIGA® pot interaccionar amb altres medicaments i, com a conseqüència, els nivells sanguinis de ZYTIGA® o d'altres medicaments poden veure's afectats. Això pot impedir que ZYTIGA® o altres medicaments funcionin correctament o augmentin els seus efectes adversos. Els medicaments que poden interaccionar són:

- Antitussiu: dextrometorfà
- Antifúngics (per tractar fongs): ketoconazol, voriconazol, itraconazol
- Antibiòtics: claritromicina
- Antivírics: nelfinavir, indinavir, atazanavir
- Antiepilèptics: fenitoïna, carbamazepina, fenobarbital
- Tuberculostàtics: rifabutina, rifampicina

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent o ha pres recentment qualsevol altre medicament (incloent els medicaments adquirits sense recepta). És important que consulti al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol preparat de vitamines, plantes medicinals o suplement dietètic.

PRECAUCIONS

Eviti el contacte amb la pell. Renti's les mans abans i després de cada presa. Adopti mesures anticonceptives si la seva parella pot quedar-se embarassada i mantingui-les fins 2 setmanes després de finalitzar el tractament. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de rebre vacunes. Protegeixi's del sol amb vestuari adequat i crema amb filtre solar de protecció superior a 15.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre els medicaments, ens pot trucar al 972.27.51.30.