

## COL·LIRI DE SÈRUM AUTÒLEG 20%

### COMPOSICIÓ (10ml)

Sèrum del pacient 2 ml

Sèrum Fisiològic 8 ml

### PER QUÈ SERVEIX AQUEST MEDICAMENT?

El sèrum autòleg és un preparat a base de la seva pròpia sang centrifugada i posteriorment diluïda amb sèrum fisiològic. S'utilitza per via tòpica per a les següents patologies:

- Després de la cirurgia de la superfície ocular
- Síndrome de sequedat ocular després de trasplantament de còrnia
- Queratopatia neurotròfica
- Defecte epitelial corneal o úlceres corneals persistents

### COM L'HE D'ADMINISTRAR?

Cal instil·lar una o dues gotes dins els ulls afectats cada 8 hores, segons criteri mèdic.

- Rentis acuradament les mans abans de l'administració.
- Separar les parpelles de l'ull i instil·lar al sac conjuntival.
- No tocar el degotador, per tal d'evitar la seva contaminació.
- Rebutgeu el flascó i el contingut als 7 dies d'encetar-lo

### COM L'HE DE CONSERVAR?

Conservar en NEVERA i PROTEGIT DE LA LLUM. El flascó proporcionat pel Servei de Farmàcia protegeix de la llum, però, intenti no exposar-lo a fonts lluminoses.

### QUÈ HE DE FER SI M'OBLIDO D'UNA DOSI?

- Administri la dosi que ha oblidat el més aviat possible. Si està pròxima l'hora de la següent dosi, no ho faci i continui amb la seva pauta habitual.
- Mai s'administri el doble de dosi per compensar-la

### QUÈ HE DE FER PER RECOLLIR EL COL·LIRI? INSTRUCCIONS

- Ha de congelar els col·liris que li lliurin excepte el que s'estigui utilitzant, que l'ha de conservar a la nevera .
- La data de caducitat del col·liri és de 7 dies després de descongelar.

### QUINES PRECAUCIONS HE DE TENIR?

- Manteniu el medicament fora de l'abast dels nens.
- **Aquest col·liri és d'ús personal. No ha de ser administrat a cap altra persona**

### QUINS EFECTES ADVERSOS PUC TENIR?

Pot aparèixer una lleugera irritació ocular, cremor, llagimeig o visió borrosa que desapareixerà passats uns minuts. Si aquests símptomes persisteixen o fossin intensos comuniqui-ho al seu metge.

### CADUCITAT

- El col·liri té una caducitat de 7 DIES des del dia de descongelació i de 3 MESOS al congelador.
- No administri el col·liri després de la data de caducitat que figura a l'envàs.
- Rebutgi la resta del medicament portant-ho al servei de Farmàcia de l'hospital.

### QUÈ HE DE FER en cas d'intoxicació O SOBREDOSI?

En tractar-se d'una especialitat d'administració tòpica amb un producte d'origen endogen no existeix en la pràctica cap risc d'intoxicació sistèmica.

Per a més informació consulti al seu metge o al farmacèutic de l'hospital.