

FULL D'INFORMACIÓ D'ETANERCEPT (ENBREL®)



PAUTA POSOLÒGICA PRESCRITA:

Per què serveix aquest medicament?

ETANERCEPT està indicat pel tractament de l'artritis reumatoide, artritis idiopàtica juvenil poliarticular, artritis psoriàsica, espondilitis anquilosant, psoriasi en plaques i psoriasi en plaques en nens.



Com conservar aquest medicament?

Ha de conservar-se a la nevera (entre 2 i 8°C), MAI al congelador. Mantingui'l fora de l'abast dels nens.

Com ha de prendre's aquest medicament?

Ha de canviar-se cada vegada el lloc de la injecció, alternant entre la part del darrere del braç, abdomen i cara interna de la cuixa.

Per tenir menys dolor en el lloc de la injecció convé treure la xeringa de la nevera un quart d'hora abans d'administrar-la. No agiti la ploma ja que pot fer malbé el contingut. Llenci-la després d'utilitzar-la.



1. Renti's bé les mans amb aigua i sabó.
2. Desinfecti la zona de punció amb povidona iodada o alcohol i deixi-la assecar.
3. Introdueixi l'agulla en la zona formant un angle de 90° amb un moviment ferm i segur.

4. Injecti el medicament lentament (0.5-1 minut) ja que és menys dolorós i donem més temps per l'absorció.
5. Espera 10 segons, retiri l'agulla amb suavitat i rapidesa.
6. Desinfecti de nou.
7. Premi lleugerament i faci una mica de massatge per afavorir l'absorció.

Què fer si s'oblida d'una dosi?

Haurà d'injectar-la tant aviat com ho recordi. A continuació, segueixi amb la pauta habitual.

Si no ho recorda fins el dia en què ha d'administrar-se la dosi següent, no s'injecti una dosi doble (dues dosis al mateix dia) per compensar la dosi oblidada.

Quins efectes adversos poden aparèixer?

- **Reaccions en el lloc de la injecció** com envermelliment i/o picors, blaus, dolor o inflor. Per evitar-ho, és important rotar el lloc de la injecció i aplicar fred sobre la pell abans de l'administració.
- **Mal de cap:** pot prendre un analgèsic, per exemple, paracetamol.
- **Infeccions** com un refredat comú, bronquitis, cistitis i infeccions de la pell. Eviti el contacte amb persones refredades o que pateixin alguna infecció. Si té molta mucositat begui molta aigua o líquids per ajudar a fluidificar-la i poder expulsar-la amb facilitat. Si no desaparegués o tingués febre persistent, consulti al metge. Si ha de ser sotmès a qualsevol cirurgia, incloent la dental, comenti al seu doctor o dentista que vostè està prenent ENBREL®.

Si apareguessin reaccions al·lèrgiques, pruija (picor), dificultat per empassar, signes d'hemorràgia (hematomes), signes d'infecció o qualsevol dels efectes adversos no desaparegués o empitjorés, avisi ràpidament al seu metge.

Precaucions especials

Pacients amb infeccions bacterianes (tuberculosi activa o latent) i hepatitis B.

Pacients amb problemes cardíacs i/o insuficiència cardíaca.

No es recomana l'administració de vacunes de virus vius com la de la xarampió, rubèola, parotiditis, varicel·la, febre groga, poliomielitis oral (Sabin), tuberculosi (BCG), febre tifoide i còlera oral. Consulti abans amb el seu metge.

A les dones en edat fèrtil se'ls hi recomana utilitzar un mètode anticonceptiu adequat per prevenir l'embaràs i continuar el seu ús durant almenys 3 setmanes després de l'última injecció d'ENBREL®.

Tampoc es recomana la lactància materna durant el tractament amb ENBREL®.

Per qualsevol dubte o consulta sobre el tractament pot trucar-nos al 972.27.51.30.