

Unitat de Cirurgia de curta estada (UCE)

Hospital de Dia Mèdic-Quirúrgic

PROPÒSIT

El propòsit és realitzar, en un àmbit confortable i amb personal altament qualificat, una intervenció sota anestèsia local, regional o general, amb la particularitat que vostè podrà tornar a casa amb la seva família el dia següent a la intervenció quirúrgica.

COM FUNCIONA LA UNITAT DE CIRURGIA DE CURTA ESTADA

- En el moment d'indicar la intervenció el cirurgià decideix el tipus d'ingrés
- Ha calgut l'acceptació per part del pacient
- Ingré el mateix dia de la intervenció
- Alta l'endemà de la intervenció quirúrgica
- Seguirà els controls a Consultes Externes en pocs dies

PENDENT D'INTERVENIR

Si hi ha algun canvi en el seu estat de salut, avisi al seu cirurgià o al servei d'admissions de l'hospital el més aviat possible.

EL DIA ABANS DE LA INTERVENCIÓ

- La nit anterior sopi lleugerament.
- Prengui la medicació que li ha donat la infermera: el protector d'estómac (ranitidina 2cp) abans de sopar i si li han donat diazepam, abans d'anar a dormir.
- Es dutxi. Utilitzi el sabó de clorhexidina pel cos. El cap i la cara amb el seu sabó habitual.

EL DIA DE LA INTERVENCIÓ

- Abans de venir a l'hospital s'ha de tornar a dutxar com la nit anterior i fer un bon raspallat dental.
- Recordi que no pot menjar ni beure res 6h abans de l'arribada a l'hospital.
- No utilitzi maquillatge ni esmalt d'ungles. No porti joies ni res de valor.
- Prengui la medicació habitual (amb molt poca aigua) si li ha dit l'anestesiòleg.
- Ha de portar un batí, unes sabatilles, pijama o camisa, tovallola i estris d'higiene personal.
- El nombre permès d'acompanyants és d'un, poden ser dos si són nens.
- A l'arribada a l'Hospital es presenti a la recepció que prèviament li hauran indicat.
- Han d'apagar els telèfons mòbils a l'arribada de la unitat.

A L'ALTA DE L'HOSPITAL

- El dia següent a la intervenció del metge li donarà l'alta.
- A l'informe que se li facilitarà hi haurà les recomanacions pertinents.

A CASA SEVA

- Posi's el termòmetre totes les tardes a la mateixa hora. Els dos primers dies seria normal tenir unes dècimes de temperatura.
- Prengui la medicació pel dolor a les hores indicades. No esperi a tenir dolor, es trobarà millor.
- Després de l'alta haurà de seguir els controls a Consultes Externes i seguir les indicacions detallades a l'informe d'alta.

Li desitgem una total i feliç recuperació!