

DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT

ADMINISTRACIÓ PROFILÀCTICA DE VITAMINA K

..... Núm. HC.....
(nom i cognoms del nadó)

..... de anys,
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)
amb domicili a i DNI núm.
en qualitat de de
(representant legal, familiar o propparent) (nom i cognoms del nadó)

DECLARO

Que el doctor/a o llevador/a m'ha explicat que
(Nom i dos cognoms del professional que facilita la informació)
és necessari/convenient l'administració profilàctica de vitamina K.

QUÈ ÉS LA VITAMINA K?

La vitamina K és necessària pel procés de coagulació sanguínia. Sense nivells correctes de vitamina K, un nadó pot desenvolupar processos de sagnat. Aquesta deficiència se l'anomena síndrome hemorragípar i és deguda a la deficiència de vitamina K.

La vitamina K pot ser produïda pel cos humà per un tipus de bacteri que colonitza el tracte intestinal. Els nadons no neixen amb aquesta bactèria, i és possible que un nadó saludable pugui trigar fins a quatre dies en desenvolupar nivells adequats de Vitamina K (Sutor, 1999). Alguns nadons poden no produir nivells adequats, fins i tot, després d'alguns mesos. Els nadons poden prendre petites quantitats de vitamina K a través de la llet materna, però no és suficient per evitar possibles sagnats.

CONSEQÜÈNCIES ABSÈNCIA VITAMINA K

És una malaltia potencial que pot afectar aproximadament a 1 d'entre cada 5.000 (Victoria y Haecke, 1990) i 10.000 (Von Kries, 1992) nadons. Si no es fa profilaxis està present en el 1,7 % dels nadons i es manifesta clínicament en 1 de cada 200. Quan un nadó desenvolupa la malaltia és impossible aturar el sagnat.

SÍMPTOMES DEL SÍNDROME

- Equimosis i hematomes.
- Sagnat de la boca, nas, melic i anus.
- Sang en la orina, femta o vòmits.
- Sagnat perllongat en llocs de punció.
- Dificultat per respirar.
- Sagnat dins del tòrax i/o abdomen.
- Fetge de grans dimensions.

- La deficiència de vitamina K també pot causar hemorràgia intracranial. Dels nadons que poden presentar un inici tardà (després de 8 dies de vida), la meitat d'ells tindran afectació cerebral severa o mort, com a resultat de l'hemorràgia intracranial.

NADONS VULNERABLES

Alguns nadons són més vulnerables a desenvolupar el síndrome (tenen més risc), com els nadons de mares que prenguin algun tipus de fàrmac durant la gestació com **anticonvulsius, anticoagulants o medicaments per la tuberculosi**. De la mateixa forma el risc és més gran per nadons amb parts de risc com **part prematur, presentació de natges o podàlica, vacuum, fòrceps, cesària, atrèsia vies biliars i els asfíctics**. També estan dins el grup de risc els nadons que tenen alguna **lesió al fetge** o presenten **dificultats per ser alletats**. Si el vostre nadó neix fruit d'un part difícil, si té equimosis o hematomes, o precisa maniobres de reanimació, és encara més important rebre la vitamina K. També és recomanable si ha de sotmetre's a algun procediment quirúrgic.

ADMINISTRACIÓ VITAMINA K

La vitamina K pot administrar-se per via oral (substància oliosa) o intramuscular. **La injecció de vitamina K administrada al néixer o en qualsevol moment posterior és considerada la via més efectiva, ja que una sola dosis intramuscular protegeix al nadó per més temps que una sola dosis oral**. A més, existeix un major coneixement de la utilització de la vitamina K intramuscular perquè hi ha més nombre d'estudis desenvolupats.

La via oral precisa més dosis, concretament 3:

- Al néixer.
- A la setmana.
- A les quatre setmanes de vida.

L'administració oral no és efectiva quan hi ha problemes d'absorció en l'intestí.

RISCOS

Risc via intramuscular

Principalment els riscos de la injecció són: dolor local en el lloc de la injecció; lesió de vasos i nervis; abscessos; osteomielitis; hemorràgia (en un nadó amb trastorn de coagulació).

Risc via oral

Sabor amarg; inhalació de l'oli; obstrucció de vies aèries i/o pneumònia per aspiració; ignorància de la quantitat real absorbida.

Per qualsevol tipus d'administració el risc inclou xoc anafilàctic.

El Servei de Pediatria del centre, igual que l'Acadèmia Americana de Pediatria i la Sociedad Española de Neonatologia, recomana l'administració d'una sola dosis de vitamina K intramuscular.

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa o llevador/a que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que poden sorgir.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfet/a amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos.

En cas que sorgissin situacions imprevisibles en el decurs de l'actuació, autoritzo que es faci en aquell moment el que es consideri més convenient i necessari, sempre i quan no sigui possible un nou full de consentiment.

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

CONSENTO

Que el nostre nadó rebi l'administració de la vitamina K mitjançant:

- Via injecció intramuscular.
- Via dosis orals.

Mare del nadó

Pare del nadó

Professional informant

Olot, de de 20.....

DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

DECLARO

Que el professional..... m'ha explicat que és convenient l'administració de vitamina K al nostre nadó.

També se m'ha informat dels riscos que hi pot haver si no es fa aquesta administració, i que en el cas del nostre nadó poden augmentar per

He comprès les seves explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill, i el professional m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat.

Manifesto que estic satisfet/a de la informació que he rebut i que comprenc l'abast i els riscos de no realitzar l'actuació. I en tals condicions, **NO CONSENTO** sotmetre al nostre nadó a l'administració de vitamina K.

Mare del nadó

Pare del nadó

Professional informant

Olot, de..... de 20.....