




EXTRACCIÓ SEGURA D'UNA PAPARRA



Es pot fer amb tota seguretat a casa, no precisa atenció a urgències.

No es recomana posar cap producte (alcohol, oli, pegament etc.) abans de l'extracció. Provoca que l'animal s'asfixia i hi ha més probabilitat que injecti secrecions)

1. Passar la pinça al voltant de la paparra tan a prop de la pell com sigui possible



2. Tancar la pinça sobre el cap mirant de no agafar el cos i estirar lentament en direcció vertical. No girar. És important que no aixafem el cos doncs és on hi ha els possibles agents de malalties



3. Eliminar la paparra aixafant-la fort contra un material dur o ofegant-la en aigua
4. Si queda un petit tros del cap a la pell, cap problema, sortirà sol. Desinfectar amb clorhexidina o iode
5. No es recomana fer tractament antibiòtic preventiu
6. Observació: Si comença una vermellor al voltant del lloc de la picada amb tendència a augmentar de mida, o si comencen símptomes gripals en els propers dies o febre s'ha de buscar atenció mèdica i comentar el fet de la picada prèvia
7. Si us quedeu amb dubtes, comenteu-los amb el vostre pediatre

Font consultada 6/7/2018 <https://www.zecken.de/de/zecken-entfernen>
27/06/2023 <https://www.cdc.gov/lyme/es/removal/index.html>

Juny 2023