

## DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT BLOQUEIG ANESTÈSIC DEL GANGLI CELÍAC

..... Núm. HC.....  
(nom i cognoms del pacient)  
de.....anys, amb DNI núm. .... i domicili a.....  
.....

..... de ..... anys,  
(nom i cognoms del representant legal, familiar o persona vinculada de fet)  
amb domicili a ..... i DNI núm. ....  
en qualitat de .....de .....  
(representant legal, familiar o propparent) (nom i cognoms del / de la pacient)

### DECLARO

Que el doctor/a ..... m'ha explicat que  
(nom i cognoms del facultatiu que proporciona la informació)  
pel tractament de la meua malaltia és indispensable l'ANESTÈSIA DEL GANGLI CELÍAC.

### EN QUÈ CONSISTEIX EL BLOQUEIG ANESTÈSIC DEL GANGLI CELÍAC

El bloqueig del gangli celíac consisteix a interrompre la innervació simpàtica de les vísceres situades a la part superior de l'abdomen, mitjançant la injecció d'un anestèsic local. Per aconseguir-ho, és necessari realitzar dues petites punxades a l'esquena a banda i banda de la columna. S'anestesia la pell amb anestèsia local i s'introdueixen dues agulles fines fins a localitzar la zona adequada. Un cop col·locades correctament les agulles, s'injecta l'anestèsic local. Cal utilitzar petites quantitats de contrast radiològic per a comprovar la situació de les agulles: de manera que si és al·lèrgic al contrast o ha tingut algun problema en alguna exploració radiològica, comuniqui-ho al seu metge.

### RISCOS TÍPICS DEL BLOQUEIG ANESTÈSIC DEL GANGLI CELÍAC

Els efectes que vostè pot notar són:

- Es pot produir hipotensió amb sensació de lleuger mareig amb els canvis de postura, en aixecar-se de la posició de tombat.
- També pot aparèixer diarrea en alguns casos.

Aquests efectes desapareixen un cop passada l'acció de l'anestèsic, normalment unes tres o quatre hores després, encara que en alguns pacients pot ser més prolongat.

### COMPLICACIONS DEL BLOQUEIG ANESTÈSIC DEL GANGLI CELÍAC

Les complicacions del bloqueig del gangli celíac són rares.

Les més freqüents són:

- Hematoma (acumulació de sang), per punció d'algun de les venes o artèries de l'abdomen: no solen tenir transcendència
- Hematúria que es produeix per punció accidental del ronyó o de les vies urinàries. No té transcendència: normalment desapareix sola i no requereix tractament.

Molt poc freqüents, però més greus, són:

- Que l'anestèsic injectat passi a una de les venes o artèries de l'abdomen, fet que pot provocar pèrdua de consciència, convulsions i coma. Aquesta complicació requeriria mesures de reanimació, com intubació i ventilació mecànica durant unes hores.
- Hemorràgia d'algun dels vasos propers a la zona: és excepcional però podria requerir revisió quirúrgica

### RISCOS PERSONALITZATS

Aquests riscos estan relacionats amb l'estat de salut previ del pacient, i els més significatius són:

.....  
.....  
.....

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la metgessa que m'ha atès m'ha deixat fer totes les observacions que he volgut i m'ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i complicacions que per la meva situació actual poden sorgir.

Per raons d'organització és possible que l'anestesiòleg que el visita i el que practicarà l'anestèsia no sigui el mateix. En el cas en que durant el procediment sorgeixi alguna situació inesperada que aconselli variar o complementar la tècnica anestèsica prevista inicialment, autoritzo el Servei d'Anestesiologia a realitzar el que cregui convenient o necessari. He entès i accepto que durant el procediment/ tractament es podran realitzar fotografies o gravacions d'imatges, que després es conservaran i es podran transmetre amb finalitats científiques i/o de docència i utilitzar en sessions clíniques, juntes facultatives, conferències, congressos, publicacions mèdiques i actes científics, sense que s'hi identifiqui la meva identitat.

També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d'aquest procés.

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el meu consentiment informat sobre la base de l'article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a <http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/>

I, en aquestes condicions,

### CONSENTO

Que se'm realitzi una anestèsia del gangli celíac.

**Pacient o representant legal**

**Metge/metgessa informant**

Olot, ..... de..... de 20.....

---

### DENEGACIÓ DEL CONSENTIMENT

Revoco el consentiment per a la realització de l'anestèsia del gangli celíac.

**Pacient o representant legal**

**Metge/metgessa informant**

Olot, ..... de ..... de 20.....