

RISCOS ESPECÍFICS MÉS FREQUENTS D'AQUEST PROCEDIMENT

Hi ha la possibilitat que persisteixi una petita quantitat d'amígdales en un o ambdós costats del paladar.

Malgrat que és excepcional, també és possible que es produeixi una hemorràgia de certa intensitat durant el període posterior a la intervenció; si aquesta hemorràgia postoperatòria fos molt intensa podria aparèixer una anèmia i inclús un xoc. Hi ha també, la possibilitat que, accidentalment, la sang que procedeix de la ferida operatòria pugui passar cap a les vies respiratòria, fet que pot arribar a obstruir les vies aèries produint, fins i tot, una parada cardiorespiratòria.

No és habitual que aquesta ferida s'infecti, però podria aparèixer una petita infecció o, si l'estat general del pacient està debilitat, una septicèmia, és a dir, la propagació de la infecció a través de la sang del pacient.

A més a més, s'ha de considerar, entre les complicacions, la possibilitat que es produeixi la pèrdua accidental d'alguna peça dental, la fisura del paladar, l'aparició d'una veu nasalitzada, que anomenem rinolàlia, i la insuficiència del vel del paladar per ocluir la part posterior de les fosses nasals, durant la deglució.

En alguns casos, pot aparèixer una torticoli, generalment passatgera, i tos persistent al llarg d'uns dies.

Aquest tipus d'intervenció, tant per la pròpia tècnica com per la situació vital de cada pacient, pot portar implícites una sèrie de complicacions comunes i potencialment serioses que podrien requerir tractaments complementaris tant mèdics com quirúrgics, així com un mínim risc de mortalitat.

Amígdales i Amigdalectomia

SERVEI
D'O.R.L.



Fundació
HOSPITAL d'OLOT
COMARCAL DE LA GARROTXA

QUÈ SÓN LES AMÍGDALES I L'AMIGDALITIS?

Les amígdals són un teixit glandular localitzat en ambdós costats de la gola. Les amígdals retenen les bacteries i virus nocius que entren per la gola i fabriquen anticossos que ajuden a lluitar contra les infeccions.

L'amigdalitis succeeix quan les amígdals s'infecten i s'inflamen.

Però les amígdals engrossides i inflamades són normals en molts nens. És possible que vostè no sàpiga avaluar si les amígdals del seu fill estan o no infectades, de manera que, en comptes de deixar-se portar per les seves pròpies apreciacions, posi la salut del seu fill en bones mans. Si sospita que el seu fill pot patir amigdalitis, truqui al pediatre. Els dolors i infeccions de gola recurrents també són un bon motiu per dur-lo al pediatre, el qual podria sol·licitar que li fessin un cultiu de secrecions faríngees per descartar o diagnosticar una infecció denominada faringoamigdalitis estreptocòcica.

QUÈ ÉS L'AMIGDALECTOMIA I EN QUÈ CONSISTEIX?

L'amigdalectomia és la intervenció quirúrgica en la qual s'extirpen les amígdals, situades en ambdues bandes dels paladar. La intervenció sol efectuar-se sota anestèsia general i a través de la boca. No obstant això, alguns especialistes poden dur-la a terme amb anestèsia local. Dels anestèsics serà informat pel servei d'anestesiologia.


Després de la intervenció, apareixen molèsties doloroses en el moment d'empassar, que solen ser intenses i prolongar-se fins a 10 o 14 dies, i que es poden irradiar cap a l'oïda; cal administrar calmants.

Pot notar-se, durant les primeres hores, la saliva tènida de sang o, fins i tot, aparèixer vòmits de sang fosca, ja digerida, i que tenen relació amb la sang deglutida durant la intervenció. També poden ser normals les femtes fosques, en els dies immediats, pel mateix motiu.

Durant els primers dies pot notar-se mal alè.

Al principi, l'alimentació consistirà només en líquids, i posteriorment serà una alimentació tova fins que es completi la cicatrització.

La durada de l'ingrés hospitalari és variable, depenent de les molèsties, l'evolució, etc. Durant l'ingrés, es controlarà la presència de febre i hemorràgia, així com el procés de cicatrització de la ferida.



DE L'ESMENTADA INTERVENCIÓ S'ESPEREN ELS BENEFICIS SEGÜENTS:

Prevenir l'aparició d'infeccions freqüents de les amígdals, així com les seves complicacions, ja esmentades. La intervenció pot millorar les alteracions de l'alimentació i la respiració, així com el ronc i les seves complicacions.

